

ALBINOOTILISI LINDE**Albinotic Birds****Tenno Laur & Lemming Rootsmäe**

Teateid albinootiliste lindude kohta on Eesti LUS-i ornitoloogiasektsioonile saabunud pidevalt igal aastal. Järgnevalt avaldame need, mis saadud kõige viimasel ajal.

Kõige rohkem on albinismi täheldatud rasvatihasel. T.Laur on röntgastamistööl Pärnumaal puutunud aastate jooksul kooku terve hulga selle liigi albinootiliste isenditega, kelle lühike kirjeldus on ära toodud allpool.

1980.a. 28.juulil Pikanõmmel asendas ühel noorel rasvatihasel musta ja rohelist värvust valkjashall toon.

1981.a. 29.novembril puudus ühel Tammistel vaadeldud rasvatihasel samuti must ja roheline värvus, mida asendas peaaegu valge toon; keha alapool oli ülaosast tumedam.

1982.a. 29.juunil oli Pikanõmmel üks rasvatihase noorlind peaaegu üleni valkjaskollane, keha ülaosa alapoollest jällegi heledam.

1983.a. 7.juunil puudus Pikanõmmel ühe pesakonna kolme noore rasvatihase sulestikus must ja roheline värvus: lindude kogu ülapiil oli valkjashall, alapool tavalisest heledam (ülejäanud seitse isendit olid normaalse värvusega).

1985.a. 16.juunil asendas ühe Pikanõmme 12-liikmelise pesakonna neljal noorlinnul musta ja rohelist värvust ühtlaselt hallikasvalge toon.

1986.a. 14.juunil täheldati Pikanõmmel eelkirjeldatud nähtust ühe 7-liikmelise pesakonna kolmel noorlinnul: musta ja kollast värvust asendas peaaegu puhasvalge toon, sellal kui lindude keha alapool oli valkjaskollane.

1985.a. juunist kuni detsembri alguseni elutses Raivo Endreksoni andmetel üks albinootiline rasvatihane ka Sindi ümbruses. Lind oli määratudvalge, tema õrnalt kollakal kõhul leidis kitsas hall pikitriip. Septembris olevat samas nähtud ka teist albinootilist rasvatihast.


Albinismi suitsupääsukesel on täheldatud kahel korral. 1986.a. 28.augustist 3.septembrini vaatles T.Laur Lao püügipunktis üleni valget suitsupääsukest, kellel vaid pealttiiva kattesuled olid kergelt pruunikad. 1989.a. juuni lõpul esines Arvo Tälli andmetel Kihnu saarel samuti üleni valge suitsupääsuke, kellel vaid kurgualune laik oli normaalselt punakaspruun.

1985.a. 8.septembril täheldas T.Laur Lao püügipunktis albinismi ka salu-lehelinnul: linnu pea oli heledalaiguline, keha alapool ja tiivaalused aga peaaegu puhasvalged. Samas vaatles T.Laur 1987.a. 30.oktoobril metsvinti, kelle kogu sulestik oli tavalisest tunduvalt heledam; seljal, peal, tiibadel ja sabal esines suuri puhasvalgeid laiike. 1989.a. 7.juunil rōngastas Tenno Laur Oti vahtkonnas (Pärnumaa) emase metstika, kelle ülapool oli täielikult kollakasvalge, nii et lind meenutas mõneti käsulast.

1990.a. 18.märtsil kohtas Lembit Enok Sojamaa asulas (Tartumaa) künnivarest, kelle õlasulestik oli puhasvalge. Sama aasta 26.veebruari nägi L.Rootsmäe Tartu Kassitoomel hakki, kelle tiivad oli valgekirjud.

1985.a. rōngastas T.Laur Lepplaanel (Pärnumaa) hiireviu pesapoja, kelle kogu alapool oli peaaegu puhasvalge, ülapool aga ookerjas, tükati valgelaiguline.

1980.a. talvitas Mart Heeringu teatel Himmastes (Põlva lähedal) Ora jõel helebeezh sinikael-part.



Pildid joonistas Tuuli Ruus