


TÖMMUKAJAKAS TALILINNUNA PÄRNUST

Tenno L a u r
Tähe 10, Pärnu EE-3600

Viimaste aastakümnete sagedased soojad talved on toonud kaasa muutusi meie linnustikus. Paljud liigid, kes varasematel aegadel harvadel või koguni üliharvadel juhtudel jäid meile talvitama, ja seda mitte igal aastal, on nüüd muutunud talvekuudel üsna sagedaseks.

Pärnus on üheks selliseks liigiks tömmukajakas. Kuigi seda lindu siinkandi laidudel pole viimasel ajal pesitsejana täheldatud, on ta paari viimase aastakümne jooksul olnud peaaegu iga-aastane talvitaja. Liigi arvukus on talvekuudel (detsember-veebruar) kõikunud 1-11 isendi piires. Mõnel aastal on liik ka puudunud (vt. joon. 1).



Joon. 1. Talvitavate tömmukajakate arv Pärnus.
Fig. 1. Number of wintering Lesser Black-backed Gulls in Pärnu.


Suurte külmade saabudes, kui Pärnu jõgi ja laht külmuvad, kogunevad köik kohale jäänud kajakad linna prügimäele. Siis võib siin näha tuhandeisendilisi parvi, mille põhiosa moodustavad höbekajakad. Talve algul on nende hulgas vähesel määral ka kalakajakaid, kes kesktalveks tavaliselt siit lahkuvad. Lumerohkkel ja külmal (vähemalt -12 °C) perioodil kajakad lahkuvad, kuid ilmade soojenedes saabuvad nad jälle tagasi. Põhiline osa talvitama jäänud kajakatest on esimese ja teise aasta linnud. Köik tömmukajakad on aga üle kahe-aastased linnud.

Märkimist väärrib 31. detsembril 1993. a. vaadeldud isend, kes kandis jalas röngast MATSALU L-6768. See lind veetis ka eelmise (1992/93) talve linna prügimäel. Linnu oli röngatanud pesapojana Jaanus Aua Harjumaal Tammneemel 11. juunil 1988. a.

Lesser Black-backed Gull as a Winter Bird in Pärnu

The Lesser Black-backed Gull has almost been an usual wintering bird in Pärnu over the last two decades. The number of birds in the winter months (December to February) has fluctuated in the range of one to eleven birds.

When severe frost appears, the River Pärnu and the Pärnu Bay freeze, then all the wintering gulls gather in the waste dumping site of the town. Then thousand-bird flocks could be seen, comprising the herring gulls mostly. The majority of the wintering gulls form the first and second year birds, whereas all the Lesser Black-backed Gulls are over than two-year-old birds.



TEADMISEKS

Aastalind 1996 on SOOKURG
Üritust veab dr. Aivar Leito.



MÄLESTAME



AULIGE

AUGUST MANK 1914 - 1996



KALEV KALM 1922 - 1996